

Volně prodejné portfolio společnosti Viatris

Allergodil oční kapky

Allergodil

- Allergodil je silné, **dlouhodobě působící antialergikum** 2. generace, s dobrou snášenlivostí a **zanedbatelným sedativním účinkem**
- Léčí příznaky **alergického zánětu** spojivek jako zarudnutí, svědění nebo slzení očí, vč. příznaků zánětu nosní sliznice

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: O použití azelastinu v období těhotenství a kojení není dostatek informací. Při použití přípravku u těhotných nebo kojících žen je proto nutné zachovávat opatrnost.
- Věkové omezení: **od 4 let**

Balení:

- 1x 10 ml/ 10 mg

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Allergodil 0,5 mg/ml oční kapky, roztok, je léčivý přípravek k očnímu podání s léčivou látkou azelastin hydrochlorid.



Allergodil nosní sprej

Allergodil

- Allergodil je silné, **dlouhodobě působící antialergikum** 2. generace s dobrou snášenlivostí a **s minimálním sedativním účinkem**
- Léčí příznaky sezónní i celoroční **alergické rýmy** jako svědění, kýchání a vodnatý výtok z nosu

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **1. trimestr a kojení zákaz**, 2. a 3. trimestr pouze na doporučení lékaře
- Věkové omezení: **od 6 let**

Balení:

- 1x 10 ml/ 10 mg

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Allergodil 1 mg/ml nosní sprej, roztok, je léčivý přípravek k nosnímu podání s léčivou látkou azelastin hydrochlorid.



Armolipid PLUS

- Armolipid Plus je doplňěk stravy
- Berberis aristata obsažená v doplňku stravy ArmolipidPlus **přispívá k normální činnosti kardiovaskulárního systému - normální hladině cholesterolu v krvi**
- Doplnky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Armolipid Plus je doplňěk stravy. Doplnky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Armolipid Plus není vhodný pro děti, mládež, těhotné a kojící ženy, osoby nad 70 let, dále pro osoby užívající hypolipidemika a osoby s onemocněním ledvin, jater a se svalovými poruchami.

Balení:

- 30 potahovaných tablet



Brufen 400 mg

BRUFEN®

- **Úleva od bolesti** hlavy, migrény, zubů i zad
- Pomáhá při **podvrtnutí** a **natažení svalů**.
- Působí **protizánětlivě**
- Snižuje horečku, **poskytuje úlevu** při **chřipkových onemocněních**

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **3. trimestr zákaz, 1. a 2. trimestr pouze na doporučení lékaře** a pokud je to zcela nezbytné, během kojení ano
- Věkové omezení: **od 12 let**

Balení:

- 30, 50 a 100 potahovaných tablet

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.



Brufen Rapid 400 mg

BRUFEN®

- **Rychlá úleva od bolesti** hlavy (i u migrény), zubů, bolesti doprovázející nachlazení a horečky
- Pomáhá při **bolestivém otoku a zánětu po poranění měkkých tkání**
- Působí **protizánětlivě**
- **Snižuje horečku** a **bolest** vznikající při akutním zánětu horních cest dýchacích

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **3. trimestr zákaz, 1. a 2. trimestr pouze na doporučení lékaře a pokud je to zcela nezbytné**, během kojení ano
- **Používat vždy krátkodobě**
- Věkové omezení: **od 12 let**

Balení:

- 24 potahovaných tablet

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Brufen Rapid je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen lysinát.



Brufen Sirup

BRUFEN®

- **Rychlá úleva od horečky**, úleva při chřipkových onemocněních a od bolesti
- Snadné použití
- Příjemná chuť

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **3. trimestr zákaz, 1. a 2. trimestr pouze na doporučení lékaře a pokud je to zcela nezbytné**, během kojení ano
- **Používat vždy krátkodobě**
- Věkové omezení: **od 3 měsíců**

Balení:

- 100 ml, suspenze

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Brufen 20 mg/ml sirup je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.



- Rychleschnoucí čirý silikonový gel k prevenci a **ošetření jizev**
- **Ulevuje od bolesti** a svědění a **snižuje zarudnutí a výšku jizvy**
- Prokazatelně **vyhlazuje, změkčuje a zjemňuje** nové i starší jizvy
- Po zaschnutí je možné nanést **make-up** - nezanechává viditelnou vrstvu

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **bez omezení**

Balení:

- 15 g tuba
- Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku Dermatix, který je určen k prevenci a ošetření jizev.



- **Léčí zácpu u dětí i u dospělých**
- **Změkčuje stolici** a tak může být prospěšný při hemeroidech, po zákroku na tlustém střevě nebo konečníku
- **Přispívá k rovnováze střevní mikroflóry**

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: bez omezení
- Věkové omezení: není věkem omezeno, ale dětem a dospívajícím pouze na doporučení lékaře, pod lékařským dohledem a jen v odůvodněných případech

Balení:

- 200 ml a 500 ml

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Duphalac je léčivý přípravek kvnitřnímu užití s léčivou látkou laktulóza.



EndWarts FREEZE

- Zdravotnický prostředek pro domácí ošetření bradavic, který **účinně odstraňuje bradavice** na ruce, pažích a chodidlech
- Jde o první prostředek pro **domácí ošetření**, který obsahuje velmi chladný plyn **oxid dusný**
- Díky technologii Ultra Freeze Technology™ **zmrazí bradavici na -80°C** až do jejích nejhlubších vrstev

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **pouze po poradě s lékařem**
- Věkové omezení: **od 4 let**

Balení:

- Cryo sprej 7,5 g

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku EndWarts Freeze, který je určen k odstraňování bradavic.



EndWarts PEN C

- Roztok je určen k ošetření **rukou, chodidel, loktů a kolen**, a to jak u **dospělých**, tak i u **dětí**
- Roztok z pera EndWarts PEN C je absorbován přímo do bradavice a **místo, kde byl roztok aplikován, se zbarví modrou barvou**
- Odstraňuje bradavice jejich postupným **vysoušením kyselinou mravenčí**

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **lze používat**
- Věkové omezení: **od 4 let** (po konzultaci s lékařem i pro děti do 4 let)

Balení:

- 3 ml

Čtěte pečlivě **návod k použití** a informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku EndWarts Pen C, který je určen k odstraňování bradavic.

EndWarts.



EndWarts ORIGINAL

- Je určený k **ošetření rukou, chodidel, loktů a kolen** dospělých i dětí
- Odstranění bradavic **vysoušením kyselinou mravenčí**
- Roztok EndWarts je absorbován přímo do bradavice a **nezanechává na kůži žádné stopy**

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **lze používat**
- Věkové omezení: **od 4 let** (po konzultaci s lékařem i pro děti do 4 let)

Balení:

- 5 ml

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku EndWarts Original, který je určen k odstraňování bradavic.



EndWarts EXTRA

- Prostředek pro účinné odstranění měkkých fibromů z pohodlí domova
- Odstraňuje stopkaté kožní výrůstky na **krku, hrudníku a v podpaží**
- Jednoduché, rychlé a efektivní použití
- Speciální pěnový hrot a ochranná pěnová náplast umožňují aplikaci přesně na fibrom - **nedochází tak k poškození zdravé okolní pokožky**

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **lze používat**
- Věkové omezení: **od 18 let**

Balení:

- 14,3 g

Čtěte pečlivě **návod k použití** a informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku EndWarts Extra, který je určen k odstraňování bradavic.



Hidrasec 100 mg

HIDRASEC[®]
RACECADOTRILUM

- Léčí **akutní průjem** u dospělých
- **Rychlý nástup účinku**
- Vhodný jako výbava pro **cesty na dovolenou**
- **Působí anti sekrečně výlučně ve střevech**

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **zákaz**
- Věkové omezení: **od 18 let**

Balení:

- 10 tvrdých tobolek

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Hidrasec 100 mg tvrdé tobolky je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou racecadotril.



- Rychle se rozpouští a přináší **účinnou pomoc u poruch trávení** vyvolaných nedostatečnou tvorbou trávicích enzymů
- **Usnadňuje trávení u osob se zhoršenou funkcí slinivky břišní** s příznaky jako je například nevolnost, bolesti břicha, nadýmání, zácpa nebo průjem

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství: **pouze na doporučení lékaře, pokud je to nezbytné**, kojení: **bez omezení**
- **Bez věkového omezení**

Balení:

- 20 a 50 tobolek

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Kreon 10 000 je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou pankreatin.



Kreon® 25 000



- Rychle se rozpouští a **přináší účinnou pomoc u poruch trávení** vyvolaných nedostatečnou tvorbou trávicích enzymů
- **Usnadňuje trávení** u osob se **zhoršenou funkcí slinivky břišní** s příznaky jako je například nevolnost, bolesti břicha, nadýmání, zácpa nebo průjem

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství: **pouze na doporučení lékaře, pokud je to nezbytné**, kojení: **bez omezení**
- **Bez věkového omezení**

Balení:

- 20 a 50 tobolek

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Kreon 25 000 je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou pankreatin.



- **Podpůrná léčba při toxickém** nebo zánětlivém **poškození jater**, nebo při **jaterní cirhóze**
- **Posiluje regenerativní schopnost jater**

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **pouze na doporučení lékaře**
- Věkové omezení: **od 12 let**

Balení:

- 30 tobolek o síle 70 mg, 30 tobolek o síle 140 mg

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Legalon 140 mg tvrdé tobolky a Legalon 70 mg tvrdé tobolky jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití s léčivou látkou silymarin.



- **Určený ke krytí zvýšené potřeby kalcia** v období růstu, těhotenství či kojení
- **K léčbě stavů** provázených **nedostatkem vápníku** nejrůznější etiologie, kde je vhodné perorální podání například jako podpurná léčba **osteoporózy, osteomalacie, spazmofilie, tetanického syndromu a alergických reakcí**

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **bez omezení**
- Věkové omezení: **bez omezení**

Balení:

- 20 šumivých tablet o síle 500 mg, 10 šumivých tablet o síle 1000 mg

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Maxi Kalz 500 mg šumivé tablety a Maxi Kalz 1000 mg šumivé tablety jsou léčivé přípravky k vnitřnímu podání s léčivou látkou uhlíčitán vápenatý.



- Léčí chronickou žilní nedostatečnost
- Redukuje otok nohou, křečové žíly, pocit tíhy, bolest, únava, svědění, napětí a křeče v lýtkách

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **zákaz**
- Věkové omezení: **od 18 let**

Balení:

- 40 a 100 tablet o síle 20 mg

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Reparil Dragées je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou escin.



- **Určený ke zlepšení obtíží při tupých poranění** jako je **vymknutí, výron a pohmoždění**
- **Pomáhá od bolesti, zánětu a otoku**
- **Příjemně chladí**

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **není doporučeno**
- Věkové omezení: **od 12 let**

Balení:

- 40 g a 100 g

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Reparil N je léčivý přípravek k vnějšímu užití obsahující léčivé látky escin a diethylamin salicylát.



Travel Gum 20 mg

TRAVEL GUM 20 mg

- Obsahuje antihistaminikum dimenhydrinát, který **je účinný při tzv. kinetózách** (nevolnosti a zvracení při cestách silničními dopravními prostředky, vlakem, letadlem nebo lodí)
- Léčivá látka se žvýkáním uvolní z perorální gumy a je sliznicí úst vstřebávána do krve
- **Vhodný na cestování a k použití i v případě, když už ke zvracení či nevolnosti došlo**

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **nelze**
- Věkové omezení: **od 15 let**

Balení:

- 10 žvýkacích gum

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Travel Gum je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou dimenhydrinát.



Zymafluor 0,25 mg

Zymafluor[®] 0,25 mg

- **Dodává zubům fluor, který zvyšuje odolnost zubů vůči kazu**
- Celý proces začíná ještě předtím, než se zuby prořežou, a pokračuje po celý život

Těhotenství, kojení a věkové omezení:

- Těhotenství, kojení: **bez omezení**
- Věkové omezení: **od 6 měsíce věku**

Balení:

- 200 tablet

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Zymafluor je léčivý přípravek k vnitřnímu užití nebo rozpuštění v ústech obsahující léčivou látku fluorid sodný.

